

Alcool

Consommation en 2021 et passages aux urgences en 2023

Auvergne-Rhône-Alpes

SOMMAIRE

Page 2 – Consommation quotidienne d'alcool **Page 3** – Alcoolisations ponctuelles importantes (API) mensuelles **Page 4** – Dépassement des repères de consommation à moindre risque **Page 5** – Passages aux urgences en lien direct avec l'alcool **Page 6** – Pour en savoir plus

SYNTHÈSE

En France, la consommation d'alcool est à l'origine de 41 000 décès par an et comporte de nombreux risques pour la santé, à court et à long terme. Bien que la mise en place de politiques publiques (comme la Loi Evin de 1991) ait entraîné une baisse de la consommation ces dernières décennies, la France présente des niveaux de consommation toujours élevés (au-dessus de la moyenne européenne et des autres pays à l'échelle mondiale selon l'OMS et Eurostat), et certains modes de consommation comme les alcoolisations ponctuelles importantes (API) sont stables voire en augmentation dans certaines régions [1,2].

Ce point épidémiologique Auvergne-Rhône-Alpes, à destination des acteurs régionaux, a pour objectif de fournir, à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021 [3] et du réseau de surveillance des urgences OSCOUR® [4], des indicateurs régionaux clés pour la mise en place et l'évaluation de politiques locales de prévention.

En Auvergne-Rhône-Alpes :

Consommation quotidienne d'alcool :

- En 2021, **8,0%** des adultes de 18-75 ans ont déclaré consommer de l'alcool quotidiennement ; cette part est identique à la moyenne hexagonale. Les **hommes** et les **plus de 60 ans** présentent des parts de consommation **plus élevées**.
- **Depuis 2017**, la part des consommateurs quotidiens d'alcool **a diminué** de manière significative en Auvergne-Rhône-Alpes [5]. Cette baisse concerne plus spécifiquement les **hommes**, les **plus de 60 ans** et les personnes n'ayant **pas de diplôme ou un diplôme inférieur au Bac**.

Alcoolisations ponctuelles importantes :

- En 2021, **17,3%** des adultes de 18-75 ans ont déclaré avoir des API mensuelles ; cette proportion ne diffère pas de la moyenne hexagonale (16,5%).
- Dans la région, la part des API mensuelles **n'a pas évolué** de manière significative depuis 2017 [5].

Dépassements des repères de consommation à moindre risque :

- En 2021, **24,0%** des adultes de 18 à 75 ans ont déclaré dépasser les repères de consommation ; cette proportion est significativement **supérieure** à la moyenne hexagonale (22,0%).
- Cette proportion est **plus élevée chez les hommes**, les **moins de 30 ans**, les personnes ayant les **niveaux de revenu les plus élevés** et celles ayant un **diplôme supérieur au Bac**.

Passages aux urgences en lien direct avec l'alcool :

- En 2023, **20 000** personnes sont passées aux urgences en lien direct avec l'alcool. Hormis l'année 2020, atypique avec l'épidémie de Covid-19, qui a présenté un nombre de passages plus faible, la tendance depuis 2017 est **globalement stable**.
- La part de passages en lien direct avec l'alcool est en diminution, ceci s'explique notamment par l'augmentation des passages aux urgences toutes causes observée depuis 2021.
- Les départements de l'ex-Auvergne présentent les taux les plus importants de passages aux urgences en lien direct avec l'alcool, chez les hommes comme chez les femmes.

CONSUMMATION QUOTIDIENNE D'ALCOOL


Tableau 1. Evolution de la part de consommateurs d'alcool quotidiens* [et intervalles de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Auvergne-Rhône-Alpes, 2017-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2017 et 2021

		2017	2021	Evolution significative
Ensemble		10,0 [8,8 - 11,3]	8,0 [6,8 - 9,4]	Oui
Sexe	Hommes	14,8 [12,7 - 17,0]	11,7 [9,6 - 14,0]	Oui
	Femmes	5,4 [4,3 - 6,7]	4,6 [3,4 - 6,0]	Non
Classe d'âge	18-30 ans	2,2 [1,1 - 3,9]	2,8 [1,4 - 5,0]	Non
	31-45 ans	6,2 [4,0 - 9,2]	6,1 [3,8 - 9,3]	Non
	46-60 ans	8,4 [6,5 - 10,7]	6,8 [4,9 - 9,1]	Non
	61-75 ans	24,3 [21,0 - 27,8]	16,2 [13,1 - 19,6]	Oui
Niveau de revenu **	Faible	8,5 [6,4 - 11,0]	6,4 [4,5 - 8,8]	Non
	Moyen	9,7 [7,8 - 12,0]	8,6 [6,6 - 10,9]	Non
	Elevé	12,3 [10,0 - 14,9]	9,6 [7,2 - 12,5]	Non
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	13,9 [11,7 - 16,3]	9,9 [7,6 - 12,5]	Oui
	Bac	6,2 [4,5 - 8,4]	6,0 [4,1 - 8,5]	Non
	> Bac	6,5 [5,1 - 8,1]	7,1 [5,6 - 9,0]	Non

* Correspond à toutes personnes déclarant consommer un même type d'alcool tous les jours

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution de l'échantillon de France hexagonale (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

Figure 1. Evolution de la part de consommateurs d'alcool quotidiens [et intervalle de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, Auvergne-Rhône-Alpes, 2005-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2005, 2010, 2014, 2017 et 2021



* Evolution significative entre 2017 et 2021

ALCOOLISATIONS PONCTUELLES IMPORTANTES (API) MENSUELLES


Tableau 2. Evolution de la part de consommateurs d'alcool déclarant des API* mensuelles [et intervalles de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Auvergne-Rhône-Alpes, 2017-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2017 et 2021

		2017	2021	Evolution significative
Ensemble		17,3 [15,7 - 19,0]	17,3 [15,6 - 19,2]	Non
Sexe	Hommes	25,9 [23,3 - 28,7]	25,2 [22,4 - 28,2]	Non
	Femmes	8,9 [7,2 - 10,8]	9,8 [7,9 - 12,0]	Non
Classe d'âge	18-30 ans	32,5 [28,2 - 37,0]	28,3 [23,7 - 33,4]	Non
	31-45 ans	17,8 [14,5 - 21,5]	18,0 [14,7 - 21,8]	Non
	46-60 ans	12,3 [9,9 - 15,0]	14,5 [11,6 - 17,9]	Non
	61-75 ans	8,4 [6,2 - 11,0]	10,3 [7,7 - 13,4]	Non
Niveau de revenu **	Faible	14,6 [11,8 - 17,9]	15,3 [12,3 - 18,7]	Non
	Moyen	17,9 [15,1 - 20,9]	18,2 [15,2 - 21,5]	Non
	Elevé	19,3 [16,5 - 22,4]	19,4 [16,2 - 22,9]	Non
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	17,4 [14,9 - 20,2]	16,4 [13,4 - 19,7]	Non
	Bac	19,0 [15,7 - 22,7]	18,5 [15,0 - 22,5]	Non
	> Bac	15,9 [13,6 - 18,5]	17,9 [15,4 - 20,5]	Non

* Correspond à 6 verres ou plus en une seule occasion

** Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution de l'échantillon de France hexagonale (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

Figure 2. Evolution de la part de consommateurs d'alcool ayant des API mensuelles [et intervalle de confiance à 95%] chez les adultes de 18 à 75 ans selon le sexe, Auvergne-Rhône-Alpes, 2005-2021 – Source : Baromètres de Santé publique France 2005, 2010, 2014, 2017 et 2021



DÉPASSEMENT DES REPÈRES DE CONSOMMATION À MOINDRE RISQUE

Rappel des repères de consommation à moindre risque :

- ne pas consommer plus de dix verres standard par semaine
- ne pas consommer plus de deux verres par jour
- avoir des jours sans consommation dans une semaine

En résumé et pour une bonne compréhension du grand public : " **Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours.** "

Tableau 3. Part d'adultes de 18 à 75 ans dépassant les repères de consommation à moindre risque [et intervalles de confiance à 95%] selon le sexe, l'âge, le niveau de revenu et le niveau de diplôme, Auvergne-Rhône-Alpes, 2021 – Source : Baromètre de Santé publique France 2021

		2021
Ensemble		24,0 [22,1 - 26,0]
Sexe	Hommes	33,2 [30,1 - 36,4]
	Femmes	15,2 [13,0 - 17,6]
Classe d'âge	18-30 ans	29,1 [24,5 - 34,0]
	31-45 ans	24,5 [20,5 - 28,7]
	46-60 ans	22,6 [19,2 - 26,3]
	61-75 ans	20,6 [17,2 - 24,3]
Niveau de revenu *	Faible	19,0 [15,7 - 22,6]
	Moyen	25,3 [21,9 - 28,8]
	Elevé	30,3 [26,7 - 34,1]
Niveau de diplôme	Aucun diplôme ou < Bac	20,5 [17,3 - 24,0]
	Bac	23,5 [19,6 - 27,8]
	> Bac	28,4 [25,5 - 31,4]

* Niveau de revenu mensuel par unité de consommation du foyer de la personne interrogée, en terciles de la distribution de l'échantillon de France hexagonale (Faible : tiers de la population dont les revenus sont les plus bas / Moyen : tiers de la population avec des revenus intermédiaires / Elevé : tiers de la population dont les revenus sont les plus hauts)

Ces repères de consommation à moindre risque ont été établis en 2017 par un groupe d'experts et inclus pour la première fois dans le Baromètre de Santé publique France 2017 au sein d'un sous-échantillon ne permettant pas d'avoir des effectifs suffisants pour disposer d'estimations au niveau régional. Il n'est donc pas possible d'analyser les évolutions au niveau régional pour cet indicateur.

PASSAGES AUX URGENCES EN LIEN DIRECT AVEC L'ALCOOL

- En 2023, 20 009 personnes sont passées aux urgences en lien direct avec l'alcool*, soit en moyenne 55 passages quotidiens. Ces passages représentaient ainsi 0,93% des passages aux urgences toutes causes confondues dans la région (vs 1,08% au niveau France entière).
- En 2023, le taux de passage aux urgences en lien direct avec l'alcool était plus élevé chez les hommes (1,30%) que chez les femmes (0,53%) et il était le plus élevé chez les 46-60 ans (2,03%).
- L'intoxication éthylique aiguë était la plus représentée parmi les différentes pathologies pouvant être identifiées comme directement liées à l'alcool (42,8% des passages aux urgences en lien direct avec l'alcool).

Figure 3. Nombres et taux annuels de passage aux urgences en lien direct avec l'alcool parmi les passages toutes causes, Auvergne-Rhône-Alpes, 2017-2023 – Source : OSCOUR®





Figure 4. Taux départementaux annuels de passage aux urgences en lien direct avec l'alcool selon le sexe, Auvergne-Rhône-Alpes, 2023 – Source : OSCOUR®



* Le regroupement syndromique « passages aux urgences en lien direct avec l'alcool », correspond aux codes diagnostics de la 10^e Classification internationale des maladies (CIM-10) dont les libellés sont : intoxication éthylique aiguë ; syndrome de sevrage ou de dépendance, sevrage d'alcool ; autres troubles mentaux liés à l'alcool ou sans précision ; autres intoxications par alcool ou sans précision ; effet à long-terme de la consommation d'alcool pour alcoolisation materno-fœtale ; auto-intoxication par l'alcool et exposition à l'alcool.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Indicateurs régionaux issus d'autres sources de données : [Enquête ESCAPAD 2022](#) (jeunes de 17 ans)
- [Géodes](#) : Indicateurs : cartes, données et graphiques > par déterminant > Alcool

Références bibliographiques :

1. Andler R, Quatremère G, Gautier A, Nguyen-Thanh V, Beck F. Consommation d'alcool : part d'adultes dépassant les repères de consommation à moindre risque à partir des données du Baromètre de Santé publique France 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(11):178-86. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2023/11/2023_11_2.html
2. Andler R, Quatremère G, Richard JB, Beck F, Nguyen-Thanh V. La consommation d'alcool des adultes en France en 2021, évolutions récentes et tendances de long terme. Bull Épidémiol Hebd. 2024;(2):22-31. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2024/2/2024_2_1.html
3. Soullier N, Richard JB, Gautier A. Baromètre de Santé publique France 2021. Méthode. Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, 17 p. <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/barometre-de-sante-publique-france-2021.-methode>
4. Caserio-Schönemann C, Bousquet V, Fouillet A, Henry V, pour l'équipe projet SurSaUD®. Le système de surveillance syndromique SurSaUD®. Bull Épidémiol Hebd. 2014;(3-4):38-44. http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2014/3-4/2014_3-4_1.html
5. Bulletin de santé publique [Auvergne-Rhône-Alpes](#) Alcool 2020

Alcool info service : des outils et des conseils pour tous les consommateurs d'alcool et leurs proches

Alcool info service propose aux consommateurs d'alcool et à leur entourage des informations, des outils pour faire le point sur leur consommation, des conseils et de l'aide par internet ou par téléphone.



**Retrouver les documents de prévention concernant l'alcool
produits par Santé publique France (vidéos, spots audio, brochures, affiches)
à destination du grand public et des professionnels de santé :**

<https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/outils>

Comité de rédaction : A. Thabuis², R. Andler¹, P. Bernillon², V. De Lauzun², M. Martel², V. Nguyen Thanh¹ M. Rivière²

¹ Direction de la prévention et promotion de la santé, ² Direction des régions

Rédactrice en chef : C. Saura

Contact Santé publique France Auvergne-Rhône-Alpes : cire-ara@santepubliquefrance.fr