1^{er} décembre 2020 – 17h00 – 18h30

ARS Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon

Développement de la Réhabilitation Améliorée après Chirurgie

*Webinaires de bilan et de retours
d'expériences de la Vague 2
en région Auvergne-Rhône-Alpes*

Programme du webinaire : 1^{er} décembre 2020

17h00 – Introduction - *Igor BUSSCHAERT, directeur de l'offre de soins, ARS ARA*

17h05 – Bilan de la démarche

- **Diversité des actions / Les résultats (audit des pratiques/PMSI)** – *Dr Martine GELAS-BONIFACE, Edwige OLMEDO, ARS ARA - Philippe DEVILLERS, APSIS Santé*

17h20 – La RAC, au coeur de la stratégie de soins

- **Une stratégie Globale Parcours avec le comité RAC établissement** - *Pr Nicolas BOURDEL, chirurgien gynécologique, CHU Clermont Ferrand*
- **Travail et communication multi spécialités** - *Anne MIERMONT Chargée Mission direction, Dr Nicolas CHOPIN, Chirurgien Gynécologique, Dr Mayeul TABUTIN, Chirurgien Thoracique, Centre Léon Bérard*
- **La RAC, du protocole colorectal aux autres spécialités, stratégie d'établissement** - *Dr Franck MAISONNETTE, chirurgien digestif, HP Loire*
- **Le rôle de la direction** - *Véronique FAUJOUR, directrice adjointe Coopérations et Stratégie, HCL*

18h00 – La RAC, les mesures émergentes

- **Analgésie par voie orale pour un patient plus mobile** – *Dr Nathanaël EISENMANN, anesthésiste réanimateur, responsable de service, Centre Jean PERRIN*
- **Gestion de l'anxiété, nouvelle dimension de l'infirmier** – *Isabelle LAFORTUNE, IDE coordinatrice RAC, HCL Lyon-Sud et Maud REGUDY, IADE, HCL Lyon-Est*

Introduction

Igor BUSSCHAERT
Directeur de l'Offre de soins
ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Introduction

5'

Evolution du nombre de patients COVID et non COVID en réanimation depuis septembre 2020

Taux de positifs RT-PCR et/ou antigéniques par semaine depuis le 11 mai (début semaine 20) et taux d'incidence pour 100 000 hab.

Source : extraction SI-DEP du 23/11/2020 par départements ARA + départements limitrophes et INSEE RP2017

Evolution du nombre d'entrées quotidiennes de patients COVID graves en réanimation et du nombre moyen d'entrées quotidiennes en HC de patients COVID sur les sept derniers jours.

■ Nb moyen d'entrées quotidiennes en hospitalisation conventionnelle sur les sept derniers jours

■ Nb quotidien d'entrées en réanimation

3 vagues d'accompagnement RAC : 74 équipes au total

△ référent
○ postulant

- Colorectal
- PTH PTG
- Bariatrique
- Thoracique
- Hystérectomie
- Hernie discale
- Coiffe Epaule
- Cystectomie
- Césarienne

Légende

- Autoroutes concédées
- Réseau routier national
- Réseau routier départemental

Bilan des actions

*Richesse et diversité
des actions mises en place*

Dr Martine GELAS-BONIFACE

Médecin Référent ARS ARA

5'

Vague 1 – 38 équipes (2015, ancienne région Rhône-Alpes)

Vague 2 – 21 équipes (Grande Région)

△ référent
○ postulant

Colorectal
PTH PTG
Thoracique
Hystérectomie

Vague 3 – 24 équipes (Grande Région)

	référent
	postulant
	Hernie discale
	Hystérectomie
	PT genou
	Coiffe Epaule
	Cystectomie
	Césarienne

	réfèrent
	postulant
	Colorectal
	PTH PTG
	Bariatrique
	Thoracique
	Hystérectomie
	Hernie discale
	Coiffe Epaule
	Cystectomie
	Césarienne

- La RAC pour toutes les spécialités
 - ✓ Gynécologie, thoracique pour la vague 2
 - ✓ Urologie, obstétrique, chirurgie de l'épaule, du rachis pour la vague 3
- La RAC pour tous les patients sans contre-indication
 - ✓ Personnes âgées, enfants / oncologie, urgences
- Une équipe ARS et un prestataire APSIS Santé et son représentant Philippe DEVILLERS
 - ✓ L'expérience et les outils
- Pour toutes les équipes
 - ✓ La persévérance pour vaincre les résistances et l'imagination

- **La RAC n'est pas un dogme c'est une pratique évolutive**
 - ✓ Elle devient la norme
- **La RAC est institutionnelle**
 - ✓ Implication des directions
 - ✓ Création du poste d'IDE de coordination
- **La RAC est un parcours organisé en constant perfectionnement**
 - ✓ La sortie s'organise avant l'entrée
 - ✓ L'information et la participation du patient et de son entourage familial et professionnel au centre de votre prise en charge

Différents types d'actions

Journal de bord du patient

Groupe Hospitalier
BOURGOIN
GHND

Journal de bord du patient

Cette fiche de bord de patient est à compléter au plus tard le jour de votre sortie et à remettre à votre médecin traitant, à votre pharmacien ou à votre infirmier. Elle sera utilisée pour évaluer votre participation et votre adhésion aux recommandations de votre médecin traitant. Elle sera utilisée pour évaluer votre participation et votre adhésion aux recommandations de votre médecin traitant.

AVANT L'OPÉRATION Date :

J'ai reçu la fiche d'information Oui Non

J'ai saisi la finalité des soins que j'ai eu Oui Non

Le cas échéant, j'ai eu besoin de renseignements complémentaires oraux Oui Non

Le cas échéant, j'ai respecté la recommandation d'arrêter de fumer au moins 3 semaines avant mon intervention chirurgicale Oui Non

Le cas échéant, j'ai suivi les prescriptions de préparation physique et/ou respiratoire avant mon intervention chirurgicale Oui Non

• Volume respiratoire pré-opératoire :

Le cas échéant, j'ai bu le produit destiné à améliorer mes défenses immunitaires ou le complément alimentaire Oui Non

Le cas échéant, j'ai pu boire la totalité du liquide prescrit qu'on m'a proposé la veille Oui Non

• Si non : Je n'en ai bu qu'une partie Je n'en ai bu rien

LE 1^{ER} JOUR APRÈS L'OPÉRATION

ALIMENTATION

J'ai bu : Aucune (1 litre) Peu Pas du tout

J'ai mangé : Bien (7/10) Peu Pas du tout

Projet quotidien (repas) : 1 repas 2 repas 3 repas

DOULEURS ET NAUSÉES

J'ai eu des nausées : Oui Non

J'ai vomis : Oui Non

Sur une échelle de 0 à 10, mon plus haut niveau de douleur en mouvement est de :

0 2 4 6 8 10

Date :

ACTIVITÉ MOTRICE

Temps assis (différent de l'heure de repos) en minutes :

Temps de marche (différent de l'heure de repos) en minutes :

Nombre de marches réalisées (consulter en nombre de fois) :

Temps total de l'activité motrice (en minutes) :

Kinésithérapie respiratoire :

Volume réalisé :

• Matin • Midi • Soir

Différents types d'actions

Rencontres médicales et paramédicales

Ouverture sur la ville

Clinique de la PERGOLA VICHY

INSCRIPTIONS

Pas de frais d'inscription dans le cadre du DPC.

- Indemnisation de 148€ dans le cadre du DPC

Sur le site : www.universite-elsan-dpc.com
Par tel : 06 42 15 70 67
Par mail : dpc@elsan.com
Par courrier : Envoyer le bulletin d'inscription à Université Elsan - BP 70060, 67015 Strasbourg Cedex

LIEU DE LA FORMATION

Pôle Universitaire de Vichy
1 avenue des Célestins
03200 VICHY

ELSAN
POLYCLINIQUE LA PERGOLA

PROGRAMME

LES RENCONTRES MÉDICALES DE LA PERGOLA
Programme Massage - Kinésithérapie
Vendredi 11 octobre 2019

ELSAN UNIVERSITÉ

Di

odoc

ELSAN LAVERGNE

INSCRIPTIONS

Pas de frais d'inscription.

- Indemnisation de 168€ dans le cadre du DPC.

Sur le site : www.universite-elsan-dpc.com
Par tel : 06 42 15 70 67
Par mail : dpc@elsan.com
Par courrier : Envoyer le bulletin d'inscription à Université Elsan - BP 70060, 67015 Strasbourg Cedex

LIEU DE LA FORMATION

Pôle Universitaire de Vichy
1 avenue des Célestins
03200 VICHY

ELSAN
POLYCLINIQUE LA PERGOLA

PROGRAMME

LES RENCONTRES MÉDICALES DE LA PERGOLA
Petit-Perceuses Invisibles
Vendredi 11 octobre 2019

ELSAN UNIVERSITÉ

Di

odoc

ELSAN LAVERGNE

Ecole des patients

Clinique des Cèdres
GRENOBLE

Info patients

De la technique chirurgicale à l'auto-rééducation du patient

Centre Hospitalier
BELLEY

Dans la gonarthrose, les parties usées (condyles, plateaux tibiaux et rotule) sont remplacées par les pièces prothétiques.

Phase préopératoire :

- Avant votre hospitalisation vous devez vous munir de :
 - Pince de préhension
 - Chausse pied à long manche
 - Chaussures adaptées (qui tiennent aux pieds et facile à mettre)
 - Une paire de cannes anglaises avec embouts neufs
 - Vêtements faciles à mettre

- Apprentissage du déplacement avec deux cannes anglaises accompagné de votre kiné
- Apprentissage des exercices de renforcement musculaire : par ex. contraction isométrique du quadriceps etc.
- Essayer la mobilisation passive continue par arthromoteur (KINETEC) chez votre kiné
- Le patient DOIT ETRE ACTEUR DE SA REEDUCATION

Comment régler vos cannes anglaises :

La main doit se trouver environ à hauteur de votre entrejambe. Le coude doit être fléchi de 30° pour être en position de force.

Comment marcher avec vos cannes anglaises :

1. On pose les deux cannes anglaises devant soi sur une même ligne.

2. On avance la jambe opérée entre les deux cannes.

3. On passe le poids du corps sur les deux cannes en appuyant sur les bras pour soulager l'appui sur la jambe opérée.

4. On profite de cet appui sur les cannes pour passer l'autre jambe vers l'avant.

Comment monter et descendre des escaliers :

A la montée, placez en premier la jambe non opérée sur la marche du dessus...

Hissez-vous et ramenez à la même hauteur la jambe opérée...

et les deux cannes. Recommencez de la même façon pour la marche suivante.

A la descente, il faut placer mes cannes en premier sur la marche en dessous et ramener la jambe opérée à la même hauteur...

puis descendre la jambe saine sur la même marche. Descendre marche par marche.

Rappelez-vous que :

- Les cannes doivent toujours accompagner la jambe opérée
- Vous pouvez remplacer une des cannes par la rampe.

Une enveloppe régionale dédiée d'un montant de 700 000 € via le Fonds d'intervention régional (FIR) => **30.000 € max par équipe engagée dans la démarche**

Cet accompagnement visait à soutenir l'engagement de chaque équipe dans la démarche de développement de la RAC en lien avec son plan d'actions.

Ces crédits ont permis de financer 4 types d'investissements :

→ Achats de différents types d'équipements

- Achat d'équipements médicaux (équipements de haute technicité ou techniques innovantes - anesthésiques, chirurgicales de réhabilitation rapide) ; autres

→ Communication patients

- Prestations : réalisation de vidéo et/ou de plaquettes d'information patients

→ Modernisation des structures et adaptation des organisations

- Travaux d'aménagement salle de kiné, zone d'attente patients (snoezelen, 3D...), bureau de consultations IDE

→ Formation des professionnels

- Formation Hypnose, Touch therapy, aromathérapie ...

Répartitions des différents types d'équipements

- Equipements médicaux
- Equipements pour une reprise d'activité physique
- Equipements pour réduire le stress des patients
- Equipements pour salle d'attente ou bureau de consultation IDE
- Equipements salon d'attente bloc
- Equipements pour favoriser l'information patient
- Equipements pour faciliter la mobilisation des patients

Principaux équipements médicaux

Appareil de monitoring du remplissage	5
Attelles de cryothérapie	3
Bladder Scan	3
Réchauffeur de perfusion	2
Monitoring curarisation	2
Valises auto aspirantes TOPAZ	2
Doppler oesophagien	1
Oxymetre	1

Les résultats

Audits des pratiques & PMSI

Edwige OLMEDO, ARS ARA

Philippe DEVILLERS, APSIS Santé

Un suivi de la démarche à 2 niveaux :

- MICRO → Audit des pratiques au quotidien par les équipes
- MACRO → Suivi au niveau régional de 4 indicateurs retenus avec des données détaillées par trimestre via le PMSI

Suivi MICRO – Audit des pratiques

Utilisation de l’outil AUDIT de GRACE

- Saisir des dossiers des patients intégrés dans la démarche RAC
- Pour aider à la collecte des données, des fiches navettes ont été conçues
 - Colorectal, PTH/PTG, hystérectomie
- Cas particulier de la chirurgie thoracique
 - Non incluse dans GRACE AUDIT
 - Une fiche particulière

Malgré le temps important pour ce suivi, la plupart des équipes ont été observantes

The image displays two 'Fiche Navette' forms, one for 'HANCHE GENOU' (Hip/Knee) and one for 'HYSTERECTOMIE' (Hysterectomy). Each form is a detailed checklist divided into several sections: PREOP (Pre-operative), PEROP (Intra-operative), POSTOP (Post-operative), SORTIE (Discharge), SUIVI (Follow-up), and RECOURS (Recourse). The forms include checkboxes for various clinical indicators, patient characteristics, and procedural details. For example, the PREOP section includes checkboxes for 'Anesthésie générale', 'Prise en charge préop', and 'Prise en charge postop'. The PEROP section covers 'Durée opératoire', 'Hémorragie', and 'Mort'. The POSTOP section includes 'Mort', 'Mort précoce', and 'Mort tardive'. The SORTIE section has checkboxes for 'Date de sortie', 'Mort', and 'Mort précoce'. The SUIVI section includes 'Suivi programmé', 'Suivi non programmé', and 'Suivi non suivi'. The RECOURS section includes 'Recours à la chirurgie', 'Recours à la chimiothérapie', and 'Recours à la radiothérapie'. The forms are designed to be filled out by medical professionals to track patient outcomes and surgical practices.

TOUTES LES EQUIPES DE LA VAGUE 2

Activité et application globale des recommandations

Durée postop théorique et retard éventuel de sortie

Développement de la RAC pour la Chirurgie Colorectale

Choisir 6 recos maximum

n	Pré - Information Patient	100%
n	Pré - Immunonutrition	35%
n	Pré - Suppl. nutritifs	8%
n	Pré - 0 prépa colique	100%
n	Pré - 0 prémédication	93%
o	Pré - Jeûne moderne	77%
n	Pré - Apport HC	66%
n	Per - Antiobioplx	100%
n	Per - Prév. hypothermie	100%
n	Per - Voie d'abord	61%
n	Per - Multianalgésie	96%
n	Per - Opt. Remplissage	53%
n	Per - Prév. NVPO	95%
o	Per - 0 drainage	70%
n	Per - Corticoïdes	60%
n	Per - Retrait SNG	9%
n	Per - Retrait SU	28%
n	Post - Multianalgésie	99%
o	Post - Abl. précoce drain	80%
n	Post - Thromboplx	100%
o	Post - Mobilisation H24	94%
n	Post - Alimentation H24	94%

Zoom sur des recommandations ciblées

Complications 3+ et réadmissions

Motifs complications (dernière période)

- 2** hémopéritoine
- 2** anémie
- 1** trouble du rythme
- 1** pneumopathie
- 1** péritonite
- 1** hématome anastomotique

Site A

Activité et application globale des recommandations

Choisir 6 recos maximum

- n Pré - Information Patient
- n Pré - Immunonutrition
- n Pré - Suppl. nutritifs
- n Pré - 0 prépa colique
- n Pré - 0 prémédication
- o Pré - Jeûne moderne
- n Pré - Apport HC
- n Per - Antibioptplx
- n Per - Prév. hypothermie
- n Per - Voie d'abord
- n Per - Multianalgésie
- n Per - Opt. Remplissage
- n Per - Prév. NVPO
- o Per - 0 drainage
- n Per - Corticoïdes
- n Per - Retrait SNG
- n Per - Retrait SU
- n Post - Multianalgésie
- o Post - Abl. précoce drain
- n Post - Thrombopplx
- o Post - Mobilisation H24
- n Post - Alimentation H24

Zoom sur des recommandations ciblées

Site B

Activité et application globale des recommandations

Choisir 6 recos maximum

- n Pré - Information Patient
- n Pré - Immunonutrition
- n Pré - Suppl. nutritifs
- n Pré - 0 prépa colique
- n Pré - 0 prémédication
- o Pré - Jeûne moderne
- n Pré - Apport HC
- n Per - Antibioptplx
- n Per - Prév. hypothermie
- n Per - Voie d'abord
- n Per - Multianalgésie
- n Per - Opt. Remplissage
- n Per - Prév. NVPO
- o Per - 0 drainage
- n Per - Corticoïdes
- n Per - Retrait SNG
- n Per - Retrait SU
- n Post - Multianalgésie
- o Post - Abl. précoce drain
- n Post - Thrombopplx
- o Post - Mobilisation H24
- n Post - Alimentation H24

Zoom sur des recommandations ciblées

Site postulant C – Chirurgie Colorectale

Des progrès importants dans de nombreuses pratiques.
Des points durs qui demeurent, en lien avec des choix de pratiques, d'organisation ou d'équipement.

Site référent D – Chirurgie Colorectale

Même pour une équipe très expérimentée, rien n'est jamais acquis: si certaines pratiques continuent de progresser, d'autres s'érodent et sont à renforcer.

Chirurgie PTG/PTH (Clinique St Charles)

Jeûne libéral

Suite à des annulations de premiers patients au bloc, les patients prévus après 13h avaient pris un petit déjeuner léger.

Nouvelle consigne: *les patients opérés sur un programme du matin après 13h n'ont plus pour consigne de prendre un petit déjeuner léger avant 7h.*

La secrétaire lors de l'appel se réfère au document donné par l'anesthésiste au patient.

Prévention de la douleur

Per opératoire :

- Paracétamol + AINS + Néfopam
- Infiltration du site opératoire par Dr A, Dr B, Dr C, Dr D

Post opératoire:

- Antalgiques per os de palier 1 et 2 (morphine en dernier recours)
- Glace ou attelle réfrigérante
- Injection intra articulaire J1 pour les PTG Dr A et Dr B

Prévention du saignement

Augmentation de l'administration d'Exacyl en per opératoire 90% des 204 patients opérés mais diminution en post opératoire 46% contre 63% en 2016.

Hémostase précautionneuse en per opératoire

Chirurgie du genou sans garrot ni redon en systématique

Prévention du risque thromboembolique

- Lever: nette amélioration en 2017 par IDE ou kinésithérapeute
- Education d'exercices kin dès J0
- Port de chaussettes de contention
- Administration d'un anticoagulant per os (rarement par injection) 100%

Suivi de 4 indicateurs détaillés par trimestre :

- Nombre de séjours,
- Durée Moyenne de Séjours (DMS)
- Taux de transfert en SSR,
- Taux de ré-hospitalisation MCO entre [0-30] j dans la même CMD

Sur une liste de racine de GHM* pour les procédures suivantes pour la vague 2 :

Chirurgie orthopédique

- 08C24 Prothèses de genou
- 08C48 Prothèses de hanche

Chirurgie viscérale - Colorectal

- 06C03 Résections rectales
- 06C04 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon

Chirurgie thoracique

- 04C02 Interventions majeures sur le thorax
- 04C03 Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire
- 04C04 Interventions sous thoracoscopie

Chirurgie gynécologique

- 13C03 Hystérectomies
- 13C14 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes
- 13C15 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes

Evolution de la Durée Moyenne de Séjour

Résultats :

- Impact positif sur la DMS avec une diminution de 2 jours
- sans répercussion négative sur le taux de ré-hospitalisation
- et une diminution des transferts en SSR de 11%

◆ Post
 ■ Ref
 — Linéaire (Post)
 — Linéaire (Ref)

Evolution du taux de réhospitalisation

Categorie	2015		2019	
	Taux Rehosp	Taux Rehosp même CMD	Taux Rehosp	Taux Rehosp même CMD
Post	4%	1%	4%	1%
Ref	4%	1%	3%	1%

Evolution du taux de transferts en SSR

Taux transfert 2015	Taux transfert 2019	Evolution entre 2015-2019	Référence Régionale 2019	Référence Nationale 2019
53%	42%	-11%	42%	45%

Chir Orthopédique - PTH

- **Impact positif** sur la DMS:
 - **3 jours** pour les postulants
 - **2 jours** pour les référents
- **sans répercussion sur le taux de ré-hospitalisation**
- **diminution de 6%** des transferts en SSR

Chir Viscérale - Colorectal

- **Impact positif** sur la DMS:
 - **1 jour** pour tous
- **répercussion positive sur les ré-hospitalisation:** légère diminution (- 2% à - 4%)
- **diminution de 5%** des transferts en SSR

Chir Gynéco - Hystérectomie

- **Impact positif** sur la DMS:
 - **4 jours** pour les postulants
 - **2 jours** pour les référents
- **sans répercussion négative** sur les ré-hospitalisations pour les postulants
- **baisse 10%** des ré-hospitalisations pour les référents

Chir Thoracique – Intv. majeures thorax

- **Impact positif** sur la DMS:
 - **2 jours** pour tous
- **avec répercussion positive** sur les ré-hospitalisations: -7% global et -4% dans la même CMD
- **sans répercussion négative** sur les transferts en SSR

Extrait de l'arrêté du 22 février 2019 :

« Art. 6 bis. – Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un GHM issu des racines 04C04, 06C03, 06C04, 06C07, 06C16, 07C09, 08C24, 08C25, 08C27, 08C48, 08C52, 10C13, 11C02, 12C11, 13C03, 13C14, 13C15:

«1o **Dès lors que le séjour est assorti du codage de la variable réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), la prise en charge donne lieu à la facturation d'un GHS de niveau correspondant au GHM issu des règles de codage du diagnostic principal (DP), du diagnostic relié (DR) et des diagnostics associés significatifs (DAS), en s'affranchissant des règles de groupage liées à la durée du séjour;**

«2o Dans les autres cas, lorsque le séjour n'est pas assorti du codage de la variable RAAC, le GHM donne lieu à la facturation du GHS qui lui est associé dans l'arrêté tarifs.»

- Importance de la mise en œuvre de cet arrêté pour le développement de la RAC et sa prise en compte comme nouveau mode de prise en charge !

Ne pas oublier de cocher les séjours RAC

Principal constat après 10 mois d'application de mars à décembre 2019 :

- la DMS des séjours cochés RAC est très en dessous des séjours non cochés RAC pour cette première année 2019 :

- 25% des séjours cochés RAAC n'appartiennent pas à l'arrêté

- 50% des séjours ayant une racine RAAC sont cochés majoritairement dans les racines suivantes :

- 08C48 PTH
- 08C24 PTG
- 08C27 Autres

Racine		Séjours non cochés		Séjours cochés RAAC	
		Nombre de séjours	DMS	Nombre de séjours	DMS
04C02	Interv majeures sur le thorax	2 409	9	387	5
04C03	Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire	461	7	4	4
04C04	Interventions sous thoracoscopie	1 384	8	179	5
06C03	Résections rectales	1 405	14	371	9
06C04	Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon	7 284	13	847	8
08C24	Prothèse genou	12 671	6	3 326	4
08C48	Prothèse hanche	11 334	5	3 629	3
10C09	Obésité	208	0	204	0
10C10	Maladies métaboliques congénitales sévères	2 084	3	26	1
10C13	Interv digestives autres gastroplastie pour obésité	3 520	3	949	1
13C03	Hystérectomies	5 200	3	244	2
13C14	Exentérations pelviennes, hystérec élargis ou vulvectomies pour tumeurs malignes	1 174	8	58	6
13C15	Exentérations pelviennes, hystérec élargis ou vulvectomies pour affections non malignes	936	4	42	2

17h20

*La RAC, au coeur de la
stratégie de soins*

Partie 1

- **Une stratégie Globale Parcours avec le comité RAC établissement -**
Pr Nicolas BOURDEL, chirurgien gynécologique, CHU Clermont Ferrand
- **Travail et communication multi spécialités -** *Anne MIERMONT Chargée Mission direction, Dr Nicolas CHOPIN, Chirurgien Gynécologique, Dr Mayeul TABUTIN, Chirurgien Thoracique, Centre Léon Bérard*
- **La RAC, du protocole colorectal aux autres spécialités, stratégie d'établissement -** *Dr Franck MAISONNETTE, chirurgien digestif, HP Loire*
- **Le rôle de la direction -** *Véronique FAUJOUR, directrice adjointe Cooperations et Stratégie, HCL*

*Une stratégie Globale
Parcours avec le comité RAC
établissement*

*Pr Nicolas BOURDEL,
chirurgien gynécologique*

CHU Clermont-Ferrand

10'

WEBINAR RAC

07/12/2020

PARCOURS DE SOINS STRATEGIE GLOBALE

D^R TEXIER Célia
P^R BOURDEL Nicolas

PARCOURS PATIENTES

A vous de nous aider pour votre prise en charge globale !!
 Remplissez ou cochez les cases **bleues**!

Nom : _____
 Prénom : _____
 Date de naissance : _____

EVALUATION NUTRITIONNELLE

- Poids habituel kg
- Poids en consultation kg : pesez-vous sur la balance à votre disposition !
- Taille m : mesurez-vous avec la toise devant vous !
- Avez-vous une perte de poids ? oui non
- Avez-vous une perte d'appétit ? oui non

A remplir par votre infirmière de programmation :

- IMC : kg/m²
 - Chirurgie de niveau 3 : oui non
 - Prise en charge nutritionnelle organisée Oui Rdv le : _____ Non
- [Délivrer ordonnance d'albumine, pré-albumine, +/- CRP + Calendrier alimentaire]*

CONDUITES ADDICTIVES

- Tabac Oui : nombre de cigarettes / j : Non
- Cannabis Oui : nombre / j : Non
- Alcool Oui : nombre de verres / j : Non
- Quelles autres substances consommez-vous régulièrement ? _____

A remplir par votre infirmière de programmation :

- Prise en charge organisée Oui Rdv le : _____ Non

EVALUATION PSYCHO-SOCIALE

- Vivez-vous seule ? Oui Non
- Bénéficiez-vous d'un entourage actif, pouvant vous venir en aide lors de votre retour à domicile ? Oui Non
- Pensez-vous ressentir le besoin d'une aide lors de votre retour à domicile ? Oui Non
- Vous êtes-vous organisée avec un proche pour assurer votre trajet aller/retour de l'hôpital ? Oui Non

A remplir par votre infirmière de programmation :

- Prise en charge psycho-sociale organisée Oui Rdv le : _____ Non

- Information des patientes
- Réorganisation de la programmation chirurgicale
- Évaluation des déficiences

Nom : _____
 Prénom : _____
 Date de naissance : _____

Remplissez les cases **bleues** et calculez votre score d'activité physique !

A Combien de fois par semaine faites-vous 20 minutes d'activité physique (tennis au point de transpirer ou de haleter (être essoufflé) ?
(Exemple : jogging, port de charge lourde, aérobie ou cyclisme à allure rapide)

- plus de 3 fois par semaine (si coché = 4 points)
- 3 à 2 fois par semaine (si coché = 2 points)
- jamais (si coché = 0 point)

B Combien de fois par semaine faites-vous 30 minutes d'activité physique modérée, ou de la marche, qui augmente votre fréquence cardiaque ou qui vous fait respirer plus fort que normalement ?
(Exemple : tondre le gazon, porter des charges légères, faire du vélo à allure modérée ou jouer au tennis en double)

- plus de 5 fois par semaine (si coché = 4 points)
- 3 à 4 fois par semaine (si coché = 2 points)
- 3 à 2 fois par semaine (si coché = 1 point)
- jamais (si coché = 0 point)

• Score ≥ 4 = Suffisamment actif :
 Demandez le livret : « Je maintiens mon activité physique »

• Score 0-3 = Insuffisamment actif :
 - Chirurgie de niveau 1 ou 2 : demandez le livret : « Je débute mon activité sportive »
 - Chirurgie de niveau 3 : demandez le livret et vous serez adressé à l'Équipe de coaching sportif

Questionnaire de Marshall

PARCOURS PATIENTES

Je démarre mon activité physique

Entre vie familiale, vie sociale, travail, stress et responsabilités, il est parfois difficile de trouver ou de trouver le temps pour une activité physique ou sportive. Il est pourtant incontestable sur le plan scientifique que la pratique régulière d'une activité physique, même modérée, représente un bénéfice important pour votre santé.

Quelques mouvements quotidiens et vous vous rendez vite compte des bienfaits que l'exercice physique vous apporte: plus d'énergie et de vitalité, bien-être et épanouissement décuplés et santé maintenue ou améliorée.

Cette brochure vous propose différents conseils et exercices simples à réaliser, pour que le mouvement fasse partie intégrante de votre vie.

Consignes de l'exercice

Exercice 1

- **Niveau 1** : assise sur une chaise dos bien droit, lever une jambe, puis l'autre, de manière alternative. Au moment où vous montez le genou : expirer, rentrer le nombril et serrez votre périnée. Relâchez ensuite dans la descente.

- **Niveau 2** : mains en appui sur une chaise (ou autre objet à hauteur de mains), pieds de la largeur du bassin, fléchir légèrement les genoux. Repère de posture : « mes genoux ne dépassent pas mes pointes de pieds dans la flexion ».

- **Niveau 3** : bras croisés au niveau de la poitrine, pieds de la largeur du bassin, fléchir les genoux jusqu'à ce que les fessiers effleurent la chaise. Repère de posture : « mes genoux ne dépassent pas mes pointes de pieds dans la flexion ».

PRE HABILITATION SPORTIVE

PARCOURS PATIENTES

APPLICATION MAELA : ACCOMPAGNEMENT PERI OPERATOIRE

7) Avez-vous des nausées et/ou des vomissements ?

Oui

Non

→ Si vous prenez des antalgiques susceptibles d'être la cause de vos nausées ou vomissements (Ibuprofène, Topalgic, Acupan), arrêtez-les et faites le point dans 2 heures. Si vos vomissements ne s'arrêtent pas, demandez à être contactée.

8) Avez-vous des frissons ou vous sentez-vous fébrile ?

Oui

Non

a. Prenez votre température :

≥ 38,5

[Pro de santé] **Patient fébrile** : La patiente se plaint d'une température > 38,5, veuillez la contacter. Si température avérée, contactez le praticien [Avertissement]

9) Comment est votre pansement / Cicatrice ?

Rougeur

[visibilité des deux] **Photo** : Veuillez prendre une photo du pansement et nous la faire parvenir [Avertissement]

Propre

Saignement

[visibilité des deux] **Photo** : Veuillez prendre une photo du pansement et nous la faire parvenir [Avertissement]

Écoulement purulent

[visibilité des deux] **Photo** : Veuillez prendre une photo du pansement et nous la faire parvenir [Avertissement]

9) Ressentez-vous une douleur anormale au niveau d'un mollet ou vous sentez-vous anormalement essouffé(e) ?

6) Avez-vous des saignements vaginaux ?

Oui

Non

→ Des saignements après ce type de chirurgie sont fréquents. Si vous avez des inquiétudes particulières, vous pouvez demander des conseils aux infirmier(e)s ou consulter les brochures expliquant les suites opératoires dans le menu « Mes documents » ou « Mon espace »

a. Comment sont ces saignements ?

Traces de sang

Un peu de sang en continu

Sang abondant

[Pro de santé] **Sang abondant** : La patiente présente des saignements importants au niveau vaginal. Veuillez la contacter pour vérifier qu'elle ne rencontre aucune complication [Avertissement]

10) Portez-vous vos bas de contention ?

Oui

→ C'est bien félicitations ! Portez vos bas de manière systématique pour éviter au maximum le risque de phlébite. Continuez comme ça !

Non

→ Veuillez porter vos bas de manière systématique après votre sortie de l'hôpital pour éviter au maximum les risques de phlébite.

PARCOURS PATIENTES

SALON D'ACCUEIL J0

ION AMELIOREE - CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE

PER OPERATOIRE

- Antibiotrophylaxie Oui Non
- Prévention de l'hypothermie Oui Non
- Analgésie multimodale per opératoire avec épargne morphinique Oui Non
- Optimisation du remplissage per opératoire Oui Non
- Prévention des nausées post opératoires Oui Non
- Corticothérapie en l'absence de CI Oui Non
- Ventilation protectrice Oui Non
- Pas de SNG Oui Non

- Voie minimale invasive privilégiée Oui Non
 - Coelioscopie Oui Non
 - Voie vaginale Oui Non
 - Laparotomie de nécessité Oui Non
- Concernant la coelioscopie Oui Non
 - Utilisation de trocarts de 5-10mm (optique) et 3-5mm (instruments) Oui Non
 - Optimisation des paramètres du pneumopéritoine
 - Faibles pressions 6-10 mmHg Oui Non
 - Gaz humidifié et réchauffé Oui Non
- Exsufflation maximale du gaz en fin d'intervention Oui Non
- Pas de drainage sauf en cas de nécessité Oui Non
- Participation à l'analgésie multimodale (infiltrations, instillations) Oui Non
- SAD retirée en fin d'intervention ou laissée en place par nécessité Oui Non
- Durée de l'intervention
 ≤ 90min 90-180min ≥ 180min
- Incident chirurgical
 Oui Viscérale Vasculaire Non
- Incident anesthésique
 Oui HypoTA (+ vasoconstricteurs) hypoxémie Non

ION AMELIOREE - CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE

Moyens nécessaires

Auto diagnostic auto-évaluation (audit)

COORDINATION COMITE DE PILOTAGE RAC

Binôme leader

**Responsable de
l'équipe paramédicale**

**Membres de
l'administration**

IDE RAC

PARCOURS PATIENTES

Travail et communication multi spécialités

*Anne MIERMONT – C. Mission DG
Dr Mayeul TABUTIN – Chir. Thoracique
Dr Nicolas CHOPIN – Chir. Gynécologue*

Centre Léon Bérard, Lyon

10'

Le contexte: Dynamique institutionnelle prédisposée

2008

Les pratiques sont hétérogènes : 8 centres ont un taux d'exercice ambulatoire supérieur ou égal au taux national de 16%

2010

2015

2017

« 1^{ère} vague »
(digestif)

Groupe francophone de Réhabilitation
Améliorée après Chirurgie

Pilotage par Les COPILs: DMS !!

DMS

SORTIE AVEC
DRAINS
2012

VIRAGE
AMBU
2014

JO
2016

RAC
2018

- ARCHITECTURE
- REALITE VIRTUELLE
- My CLB

- REGULATEUR
- STAFF DEDIES

- CHEMIN CLINIQUE
 - PRE OP
 - PER OP
 - POST OP
- IDE de Coordination

Les résultats (protocoles thérapeutiques)

- Protocoles post-opératoire (*Cristalnet*)

The screenshot shows a digital medical protocol interface. At the top, it identifies the protocol as 'aaa RAC gynécologie_laparo 1.0', version 1.0, created on 09/05/2019 at 15:37 by Dr. WALLON GREGOIRE. Below this are several empty fields for 'Commentaire général', 'Commentaire au prescripteur', 'Commentaire aux soignants', 'Références bibliographiques', and 'Hyperliens'. A navigation bar shows days from 'J0' to 'J4'. The main content area is titled 'Séquence n° 1' and 'J0'. It contains the instruction: 'Ne pas oublier de prescrire la **PCEA** si péridurale mise en place ou le **PSE de Xylocard** (0.75mg/kg/heure) si mis en place et suites aux soins continus'. Below this, there are two monitoring schedules: 1) 'A partir de J0' with 'Surveillance des constantes de 4 à 8' (Tous les jours pendant 10 jours) and '00:00, 08:00, 12:00, 18:00' (Tous les 4h), with a note: 'Poids, tension artérielle, fréquence respiratoire, saturation, fièvre, EVA, diurèse. A l'arrivée dans le service, puis toutes les heures pendant 4h, puis toutes les 6h.' 2) 'A partir de J0' with 'EVA (évaluation visuelle analogique)' (Tous les jours pendant 1 jours) and 'Tous les 1 jours à 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00'. A note below states: 'Adapter le rythme de la surveillance en fonction des valeurs retrouvées et du type de chirurgie et de traitement. Température à l'arrivée dans le service.' At the bottom, it specifies 'Mesure EVA à la mobilisation, sur une échelle de 0 à 10' and 'Perfusion: INTRAVEINEUSE À passer sur 24 heures(s)'. There is also a small blue information icon.

- Parcours de soins complexe (en amont) => HDJ

Les résultats (achat matériel)

- Oxymètres, pédaliers ...
- Système de drainage autonome
- Fauteuil J0 + réalité virtuel
- Marquage au sol des distances

Les résultats (information)

- Passeport chirurgical – pas de flyer spécifique
- Vidéo d'information (patients)
- Séminaires de formation (équipes soignantes)

POINTS POSITIFS:

- Implication membre de la direction
- Projet fédérateur (entre chirurgiens , avec les anesthésistes)

POINTS DE VIGILANCE:

- Liés à la multidisciplinarité...
- « Retard à l'allumage »
- Assurer la pérennité, formalisation des parcours

*La RAC, du protocole colorectal
aux autres spécialités,
stratégie d'établissement*

*Dr Franck MAISONNETTE,
chirurgien digestif,*
HP Loire

10'

La Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC) du protocole colorectal aux autres spécialités, stratégie d'établissement

Groupe de travail RAAC Colon HPL

Hôpital privé de la Loire (HPL), Saint-Etienne
Groupe Ramsay Santé

Un peu d'histoire

- **1995** : Nouveau paradigme : la RAAC
- **2015** : HPL, un pilote référent dans le projet RAAC ARS pour chirurgie colorectale
- **15 octobre 2015** : Participation au colloque médico chirurgical « CANCER ET AMBULATOIRE » avec une intervention du professeur Karem SLIM : Ambulatoire et Réhabilitation précoce, rapide, améliorée après chirurgie
- **2016** : Réponse à l'appel à projet de l'ARS
- **Octobre 2016** : Ouverture d'un salon RAAC avec financement par l'ARS

Salon RAC à HP Loire

Grace au financement de l'ARS, l'HPL a ouvert début octobre son Salon RAC. L'objectif est de permettre la sortie sécurisée à J3 des patients opérés d'une chirurgie colique, sélectionnés en amont par le chirurgien. Il permet dès J1 de favoriser la mobilité des patients en toute sécurité sous la surveillance d'un kiné. En fonction des possibilités des patients, ils peuvent reprendre une activité de marche ou de vélo. L'aide des appareils permet d'engager rapidement une posture moins « repliée sur soi-même », ce qui

permet aux patients d'être plus rapidement autonomes.

C'est également un lieu convivial où il est possible d'échanger autour d'un repas. « Prendre son repas dans une salle dédiée et non pas dans son lit est déjà un pas vers la guérison » déclare un patient. A ce jour, une dizaine de patients ont bénéficié de cette prise en charge. Tous ont été ravis d'intégrer ce parcours de soins. En 2017, l'objectif sera de le proposer à d'autres spécialités.

Blandine Puzenat, Resp de Service, Hôpital Privé Loire

Déploiement de la RAAC au sein de l'HPL

- **Déploiement en cohérence avec l'évolution des parcours de soins** (modification des pratiques, diminution DMS, entrées à J0...)
- **Hospitalisations conventionnelles** : Activité RAAC pluridisciplinaire
 - **2015 : RAAC Colon** - dossier ARS – Financement 2016
 - **2017 : RAAC Bariatrique**
 - **2018 : RAAC Orthopédique et neurochirurgie**
 - **2019 : RAAC Urologique** – Dossier ARS – Financement 2020-2021
 - **2021 : RAAC Thoracique et Gynécologique**
- **Hospitalisations en Ambulatoire** : Circuit Ultra Court (2019)
- **Patient**, acteur de sa prise en charge, gain en autonomie

Pratiques communes

- **Anticipation des sorties** en amont de l'hospitalisation (RAD, SSR, PRADO)
- **Entrées à J0**
- **Modification des techniques d'anesthésie et opératoires**
- **Jeûn moderne**
- **Alimentation post-op immédiate** / dans les 6h pour le digestif/ Prise des repas en commun
- **Mobilisation et lever précoce** par les kinés et utilisation du salon RAAC

Comparatif RAAC 2019-2020

<i>Evolution du taux de RAAC réalisées pour chaque intervention entre 2019 et 2020</i>			
Type d'interventions	2019	2020	Evolution du taux (en points)
Autres interventions majeures sur le rachis	52 %	90 %	+ 38
Hystérectomies	40 %	78 %	+ 38
Interventions pour reprise de prothèses articulaires	34 %	67 %	+ 33
Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses	43 %	74 %	+ 31
Prothèses de genou	60 %	90 %	+ 30
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale	43 %	73 %	+ 30
Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents	63 %	93 %	+ 30
Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes	30 %	54 %	+ 24
Prothèses d'épaule	44 %	67 %	+ 23
Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques	45 %	67 %	+ 22
Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes	37 %	59 %	+ 22
Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon	5%	25 %	+ 20

Extrait des données de 2019 (de mars à décembre) et 2020 (de janvier à septembre) à l'Hôpital privé de la Loire

Racines RAAC par spécialités en 2020 (Top 10)

<i>Taux de RAAC réalisées pour chaque intervention en 2020</i>			
Type d'interventions	Nb séjours RAAC	Nb séjours	Taux
Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité	68	72	94,44%
Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents	146	157	92,99%
Prothèses de genou	191	212	90,09%
Autres interventions majeures sur le rachis	154	171	90,06%
Autres interventions sur le rachis	216	253	85,38%
Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes	31	37	83,78%
Hystérectomies	56	72	77,78%
Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses	20	27	74,07%
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale	8	11	72,73%
Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques	65	97	67,01%

Extrait des données de 2019 (de mars à décembre) et 2020 (de janvier à septembre) à l'Hôpital privé de la Loire

Bilan

- Fonctionnement satisfaisant des pratiques RAAC étendues à toute spécialité par une interconnexion des pratiques
- Utilisation des pratiques RAAC au quotidien, sans avoir à cibler des patients
- **Projet de déploiement de l'HDJ pré opératoire sur différents spécialités (urologie, orthopédie...) :**
consultations avec équipe pluridisciplinaire
- **Aujourd'hui la norme devient la RAAC**

Le rôle de la direction

*Véronique FAUJOUR,
Directrice adjointe Coopérations et Stratégie*

HCL

10'

RAC - Réhabilitation Améliorée en Chirurgie aux HCL

Le Rôle de la Direction

Direction des Coopérations et de la Stratégie

Novembre 2020

Pourquoi c'est un enjeu fort pour les HCL et qu'il s'agit d'un investissement fort

Plus les chirurgies sont complexes et compliquées, plus le bénéfice des pratiques RAC devient un enjeu important

Chiffres 2019 :

- ① chirurgie ambulatoire 21 000 séjours = 34 millions d'euros : 10% du revenu annuel de la chirurgie (330 M€)
- ② - 14 500 séjours d'une durée supérieure à 5 nuits, valeur moyenne 10 200 €
- séjours de 3 à 5 nuits qui peuvent encore faire gagner une à deux nuitées sans abaisser le niveau de qualité de prise en charge
- ③ COVID : les recommandations sont unanimes : privilégier ces pratiques

Les HCL ne sont pas en retard / contrairement à ce qui s'est passé pour la chirurgie

Des preuves ? Quelques exemples

RAC – il y a le mot Améliorée

Adapté à tout type de chirurgie

Comment ?

- Préhabilitation à la chirurgie : diminuer les insuffisances du patient et le conditionner à sa chirurgie comme on prépare les sportifs
- Stratégie multimodale de techniques anesthésiques et chirurgicales (toute une série d'actions)
- Collaboration intensive et interdisciplinaire des personnes en contact avec le patient dont le patient lui-même
- Accélérer réalimentation, mise en mouvement et verticalisation du patient

Impossible de développer une politique RAC efficace si les pratiques varient

- d'un médecin (chirurgien ou anesthésiste) à l'autre
- d'un jour à l'autre
- d'un soignant à l'autre

= management

Chaque recommandation de pratiques est examinée par les sociétés savantes et recommandée en fonction des niveaux de preuves - à l'international et national – publications foisonnantes

Pourquoi nous réussissons

- Les équipes de direction sont aussi des sponsors, avec les équipes cliniques : Dossiers activités nouvelles
 - Dotation d'IDE de coordination, kinés et moniteurs APA (**activité physique adaptée**) , salle d'exercice physique à HLS, achats équipements pour aider à la mobilisation des patients, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques facilitant la RAC
 - Meilleure compréhension des enjeux (savoir collectif) avec des réunions de travail régulières (Direction soins, travaux, équipements bio médicaux...
- Approche multi métiers qui prend de l'ampleur : capital et savoir faire immatériel ayant une grande valeur dans le développement des pratiques pas seulement réservé aux médecins
 - Outils numériques, communications via internet, marketing de la RAC (site internet HCL)
 - Écoute des patients, tenir compte de leur expérience, rappel des patients à domicile pour le suivi
 - Tutoring hors HCL d'équipes d'établissements publics et privés
 - Ateliers kiné et IDE de coordination pour favoriser tout l'accompagnement dans les unités de soins
 - Atelier avec les cadres de soins des services de chirurgie et directeurs référents de PAM (nouveau en 2020)

Quelques posters du code de la route des couloirs du service de chirurgie digestive d'HEH

- **Eco-système favorable à la RAC**
- **au sein de la structure de soins**

**Accompagner
le changement**

En gestion des ressources humaines

- 1. Le plus dur : faire travailler tous les personnels de manière standardisée : amélioration du parcours de soins avec qualité de la prise en charge**
- 2. S'impliquer dans la refonte de l'organisation et revoir la distribution des emplois au niveau du parcours de soins**
- 3. Expliquer et communiquer sur le parcours de soins a tous les niveaux de décision : il s'agit d'une stratégie de projet médical et du projet d'établissement**

- Eco-système favorable à la RAC
- au sein de la structure de soins

Accompagner le changement

Dans l'architecture et les équipements

1. Regroupement des unités d'hébergement : ne pas avoir peur de la mutualisation. C'est la quantité d'activité qui compte : pas la quantité de lits...

2. Adapter l'architecture pour faciliter le mouvement des patients

- Salle d'exercice
- Déambulation facilitée
- Sortir du lit et de la chambre
- Prévoir des bureaux d'entretien pour la préparation des patients et proches
- Lieux et séquences type école de patients et leurs proches

Les codes de la route d'HEH

LA RAC est une innovation qui se diffuse lentement

S'évaluer : La DMS est indicateur assez révélateur mais pas un objectif

1 – Savoir faire de la RAC : C'est une propriété immatérielle possédée par une équipe, puis 2 puis 3 puis la structure de soins :

- Un « brevet » de compétence
- un savoir faire des équipes

2 - Ceux qui prennent de l'avance peuvent en tirer un avantage :

- image de marque et/ou
- avantage financier si et seulement si restructurations des organisations

**Nous avons vécu la même chose il y a 40 ans lors de l'arrivée de la chirurgie ambulatoire
La RAC concerne des séjours plus lourds avec un potentiel en journées lits bien plus élevé
Pour les structures de soins : l'efficacité économique reste à prouver en France
Aux HCL, on s'y risque et on investit en intégrant la RAC y compris dans nos projets immobiliers**

Merci

**SOIGNER
INNOVER
TRANSMETTRE**

www.chu-lyon.fr

18h00

La RAC, les mesures émergentes

Partie 3

- **Analgésie par voie orale pour un patient plus mobile**

Dr Nathanaël EISENMANN, anesthésiste réanimateur, responsable de service, Centre Jean PERRIN

- **Gestion de l'anxiété, nouvelle dimension de l'infirmier**

Isabelle LAFORTUNE, IDE coordinatrice RAC, HCL Lyon-Sud et Maud REGUDY, IADE, HCL Lyon-Est

Analgésie par voie orale pour un patient plus mobile

*Dr Nathanaël EISENMANN, anesthésiste
réanimateur, responsable de service*

Centre Jean PERRIN

10'

ANALGESIE par voie ORALE en post-opératoire

EISENMANN Nathanael
Centre Jean Perrin
Implémentation RAC

Plan

- Aspects pharmacologiques
 - Histoire
 - Biodisponibilité
 - Cinétique
 - Avantages et inconvénients
- Patient Wireless
 - Intérêt individuel
 - Intérêt pour les soignants

Histoire.

- Développement Paracétamol :
 - Phénacétine et Acétaniline début XX
 - Voie orale, MetHb, agranulocytose.
 - Acétaminophène = Paracétamol 1948
 - Proparacétamol (iv) 84
- Développement Aspirine/AINS
 - Très longue expérience de aspirine
 - Kétoprofène 1972
 - Voie intraveineuse également tardive.

- *kétoprofène* (anti-inflammatoire non-stéroïdien) : c'est le troisième produit de la série qui a été un succès mondial : 1969 : acide métizianique (Soripal®) ; 1972 : acide protizinique (Pirocid®) ; 1972 : kétoprofène (Profénid® - Orudis®).

Histoire et comportement

- Récente innovation vers les formes injectables
 - Dogme du jeun opératoire
 - Inconvénient des NVPO
 - Gold standard de la PCA de morphine.
- Renforcement positif à l'utilisation de l'analgésie par voie intraveineuse toute la fin du XX.
- Commode de ne prescrire qu'un seul schéma (iv) versus deux (avec relais po)...

« Preuves » récentes

> Arthroplastie J. 2017 septembre; 32 (95): S69-S73. doi: 10.1016 / j.arth.2017.05.002.

Publication en ligne du 11 mai 2017.

Analgésie multimodale orale pour arthroplastie articulaire totale

Gregory J Golladay¹, Karl R Balch¹, David F Dalury², Jibanananda Satpathy¹, William A Jiranek¹

Conclusion: Dans toutes les autres conditions douloureuses, il n'y a pas de preuve de différence entre les voies. Dans les états douloureux autres que les coliques rénales, il existe donc un argument solide en faveur de l'administration d'AINS par voie orale lorsque les patients peuvent avaler.

Conclusion: L'analgésie orale multimodale est recommandée dans ...la gestion de la douleur chez les patients subissant une arthroplastie de la hanche ou du genou. La réduction de la consommation d'opioïdes et la minimisation des effets secondaires sont les principaux résultats, et ...la douleur chronique.

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA
ISSN 0001-5172

Comparing analgesic efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs given by different routes in acute and chronic pain: A qualitative systematic review

M. R. TRAMÉR, J. E. WILLIAMS, D. CARROLL, P. J. WIFFEN, R. A. MOORE and H. J. MCQUAY
Pain Research, Nuffield Department of Anaesthetics, The Churchill Oxford Radcliffe Hospital, Oxford, England

Narrative Review

**Oral Oxycodone for Acute Postoperative Pain:
A Review of Clinical Trials**

Chi Wai Cheung, MD¹, Stanley Sau Ching Wong, MBBS¹, Qiu Qiu, MD¹, and
Xianyu Wang, MD²

CONCLUSION: L'oxycodone orale semble offrir une analgésie postopératoire sûre et efficace, et constitue une alternative bien acceptée et raisonnable aux analgésiques opioïdes intraveineux standard.

Pharmacologie :

- Biodisponibilité (p.o.) :
 - Paracétamol, AINS, Kétamine et NEFOPAM : BONNE
 - Morphinique : moins bonne et moins reproductible (iléus – effet premier passage hépatique...)
- Délais action : p.o. généralement différé.

Néanmoins disponibilité et cinétique sublinguale et nasale tendent vers voie i.v.

Avantages et inconvénients

- Effet pic (iv, transmuqueux) :
 - agit rapidement et puissamment (intérêt dans accès paroxystiques douloureux).
 - Effets secondaires plus marqués
- Intégrité système digestif :
 - CMF, gastrique et sus-mésocolique.
 - Iléus intense, défaillance multiviscérale.

Allègement du travail soignant

- Préparation
- Distribution
- Administration
- Surveillance
- Pas de débranchement !

Morbidités respectives

- Voie orale :
 - Moindre efficacité... légendaire
 - Observance plus aléatoire
 - Fausse route
 - Inhalation
- Intraveineuse :
 - Veinite – thrombophlébite...
 - Extravasation
 - Difficultés abords, douleurs supplémentaires...

Patient 3.0 : Wireless

- Les fils : sondes, monitoring et perfusion.
 - Enjeux RAAC.
 - Limiter nombre et durée drainages.
 - Limiter nombre et durée monitoring.
 - Limiter nombre et durée perfusion
 - Alimentation péri-opératoire
 - Analgésie orale.
 - Poursuite du traitement habituel (anti-diabétique...)
- Faut-il redéfinir indications cathéters d'ALR continue ?...

Quels morphiniques ?

- Si situation supporte l'approximation de biodisponibilité et de délai action : opioïdes usuels per-os (tramadol, codéine, morphine, oxycodone)

R3.5 – Il est recommandé de prescrire un opiacé fort (morphine ou oxycodone), préférentiellement par voie orale, en cas de douleurs postopératoires sévères ou insuffisamment calmées par les antalgiques des paliers inférieurs, et ceci quel que soit l'âge. G1+, Accord fort.

Actualisation 2016
RFE douleurs post-op
SFAR

- Si situation plus aiguë et absorption compromise : considérer voies transmuqueuses
 - Sufentanyl sublingual
 - Fentanyl intra nasal, sublingual...
- Dans le dernier cas il reste toujours la bonne vieille PCA i.v. (morphine mais pas que !)

Gestion de l'anxiété, nouvelle dimension de l'infirmier

*Isabelle LAFORTUNE, IDE coord RAC, Lyon-Sud
& Maud REGUDY, IADE, Lyon-Est*

HCL

10'

GESTION DE L'ANXIÉTÉ

NOUVELLE DIMENSION DE L'INFIRMIER

**ISABELLE LAFORTUNE, IDE COORD° RAC, HCL LYON-
SUD**

MAUD REGUDY, IADE, HCL LYON EST

BILAN RAC 2 - ARS - *01/12/2020*

DIMENSIONS DE L'ANXIÉTÉ

- PRÉ-OP

Attente de l'intervention chirurgicale, espoir de guérison, cancer, peur de l'opération / l'anesthésie, crainte des complications, pronostic de vie, qualité de vie...

- PER-OP

Au bloc : milieu aseptisé, température fraîche, pose de péridurale, moment de l'endormissement avec perte de contrôle du patient...

- POST-OP

Douleur, crainte des complications, perte de l'autonomie,

Indépendance → Dépendance

SALON D'ACCUEIL DE CHIRURGIE (HLS)

EVALUATION DE L'ANXIÉTÉ

- INTERROGATOIRE du patient :
 - En **pré-op** : Cs° IDE PH° / RAAC – Chirurgien – Anesthésiste – Secrétaire, Unité d'accueil de chirurgie...
 - En **per-op** : À l'arrivée au bloc, en SSPI
 - En **post-op** : Lors des soins, entretiens en H°
- ECHELLE A.P.A.I.S. (AMSTERDAM PREOPERATIVE ANXIETY AND INFORMATION SCALE)

The screenshot shows a web-based evaluation form for the A.P.A.I.S. scale. At the top, there are navigation icons for home, print, edit, and a 'Plus...' menu. Below these, the evaluation date is set to '25/11/2020 15:00' and the intervener is 'LAFORTUNE, Isabelle'. The main section is titled 'Scores' and contains four items, each with a 5-point Likert scale (radio buttons 1-5):

Item	1	2	3	4	5
1) Je suis préoccupé(e) par l'anesthésie*	☐				
2) Je pense continuellement à l'anesthésie*	☐				
3) Je suis préoccupé(e) par l'intervention*	☐				
4) Je pense continuellement à l'intervention*	☐				

At the bottom right, the total score is displayed as 'Score 0 /20'.

COMMENT GÉRER L'ANXIÉTÉ ?

LES NOUVELLES DIMENSIONS DE L'INFIRMIER

- **HYPNOSE** conversationnelle, hypno-analgésie
- **R.E.S.C.** (Résonance Energétique par Stimulation Cutanée) : 3 niveaux de formation.

Mvts océanographiques / Médecine chinoise – 1 séance : env. 15 min. en pré-op. / post-op.

- **MUSICOTHÉRAPIE** : Diffus° musique apaisante en chambre, au bloc op., Unité d'accueil chir.
- **AROMATHÉRAPIE** : Diffus° huile essentielle (Vertu déstressante) environnement d'une pièce, juste avant un soin.
- **COHÉRENCE CARDIAQUE** (OU RESPIRELAX): Exercices inspirat° / expirat° profondes sur 5

R.E.S.C.

<https://youtu.be/fY0uCuXGI>

COHÉRENCE CARDIAQUE / RESPIRELAX

<https://www.youtube.com/watch?v=bM3mWlq4M8E>

<https://www.youtube.com/watch?v=Tr5NI74ifcw>

18h30

Le mot de la fin

*Dr Martine GELAS-BONIFACE –
Médecin référent*

ARS Auvergne-Rhône-Alpes

- **ARS**

Edwige OLMEDO, chargée de mission Performance

04 27 86 56 21 – edwige.olmedo@ars.sante.fr

Dr Martine GELAS-BONIFACE, référent régional chirurgie-
soins critiques-réanimation

04 72 34 74 47 – martine.gelas-boniface@ars.sante.fr

- **AP SIS Santé**

Philippe DEVILLERS, Directeur Associé, Consultant

06 87 75 17 14 – philippe.devillers@apsis-sante.com